

De natuur in het Rotta-gebied in 2025

- vogels -



Lepelaar Zevenhuizerplas
© Dick Hoek

Dick Hoek

In ons gebied zijn het afgelopen jaar weer duizenden soorten geregistreerd door honderden waarnemers, vaak via de site rotta.waarneming.nl. Via deze site werden het afgelopen jaar in het werkgebied van Rotta ruim 4.000 soorten ingevoerd. Het onderstaande overzicht is aangevuld met waarnemingen van verschillende Sovon-projecten en waarnemingen van de site trektellen.nl. Een deel van de waarnemingen is nog niet gevalideerd; d.w.z. dat 'deskundigen' (validatoren) de waarnemingen nog niet beoordeeld hebben op een juiste determinatie.

In dit verslag wordt alleen aandacht besteed aan vogels. Op www.rotta-natuur.nl is het vervolg van dit deel te vinden en het verslag van de overige groepen zoals planten, vlinders, insecten, korstmossen enzovoort. Dit overzicht kon natuurlijk alleen tot stand komen dankzij de vele waarnemers die hun ervaringen wilden delen. Iedereen die dit overzicht mogelijk maakte: hartelijk dank! Ook wil ik graag Cor Noorman, Chris van Rijswijk en Maurice van Veen bedanken voor aanvullingen en verbeteringen.

Er werden in 2025 242 soorten waargenomen, waarvan 22 exoot. Het afgelopen jaar zijn er geen nieuwe soorten gezien.

Broedvogels

Brandganzen zijn tegenwoordig het gehele jaar door aanwezig, maar er werden slechts twee succesvolle broedgevallen gemeld: op de eilandjes rond de Willem-Alexanderroeibaan en uit de Voorofsche Polder bij Waddinxveen. Een waarschijnlijk broedgeval werd gemeld uit de Groenzoom. In de Voorofsche polder, de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom en in de Eendragtspolder werden gedurende het broedseizoen wel *smienten* gezien, maar er waren geen duidelijke aanwijzingen van broedgevallen. Dit geldt ook voor *wintertalingen*, met waarnemingen in de Groenzoom, de Voorofsche polder en de Eendragtspolder. In mei en juni werden rond de roeibaan in de Eendragtspolder twee paar *krooneenden* met één, respectievelijk drie donsjongen gezien. Ook in en rond het Pekland hebben waarschijnlijk krooneenden gebroed. Sterke aanwijzingen voor broedgevallen van de *zomertaling* kwamen uit het plasdras deel van de Voorofsche Polder, de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom en het Plasdrasgebied (in beide laatste gebieden ging het waarschijnlijk twee territoria) en de Eendragtspolder rond de roeibaan.

Minstens een paar *patrijzen* wist jongen groot te brengen in ons gebied. Het doek voor deze karakteristieke soort is bijna gevallen. Van 11-18 juni werden minstens drie baltsende *kwartels* gehoord in de polder Achteraf ten zuiden van het Bentwoud. Roepende *waterrallen* werden gedurende de broedtijd gemeld uit de



Patrijs

noordrand van de Zevenhuizerplas, het Plasdrasgebied, de Groenzoom en de Wiebertjes. Een paar *geoorde futen* werd van 29 april tot 5 mei rond de roeibaan gezien. Op 14 juli werd daar een juveniele vogel waargenomen die een meerkoet volgde. In de Groenzoom waren twee broedgevallen van de *steltkluut*. Eén paar was succesvol waarvan later vliegvlugge jongen werden gezien. Van de *kluut* werden minstens 23 nesten in de Nieuwe Droogmaking geteld. Hier was het broedsucces laag. In de Bergboezem (1) en de Voorofsche Polder (4) waren sterke aanwijzingen voor broedgevallen. Op de eilandjes rond de Willem-Alexanderroeibaan waren minstens tien bezette nesten

aanwezig. Ook waren er aanwijzingen voor broeden in de Zuidplaspolder. Op minstens tien verschillende plaatsen hebben *kleine plevieren* gebroed. Er werden plaatselijk ook pullen gezien. In de meeste gevallen broedden de vogels op schaars begroeid terrein, slikranden bij een lage waterstand of schaars begroeide gedeelten van het nieuwe A16 tracé.

Voor de *grutto* was 2025 in Nederland opnieuw een matig broedseizoen. Het gemiddelde broedsucces was een lichte verbetering ten opzichte van 2024, maar nog steeds onvoldoende voor behoud van de Nederlandse gruttopopulatie in de toekomst. Het beheer van de Bergboezem is speciaal afgestemd op de weidevogels. Het waterpeil wordt daarom sinds 2023 in de broedtijd verhoogd maar de resultaten vielen ook het afgelopen jaar tegen. Waarschijnlijk speelt predatie een belangrijke rol. Daarnaast is ook het graslandbeheer van belang: een mozaïek van hoog en laag gras blijkt het beste voor overleving van de gruttokuikens. In de Nieuwe Droogmaking was het broedsucces van weidevogels als *grutto*, *kievit* en *tureluur* wat beter. Andere gebieden waar de *grutto* gebroed heeft zijn: de Voorofsche Polder bij Pijnacker, de Eendragtspolder en de Voorofsche Polder bij Waddinxveen. Hier pleisterden op 29 maart 203 grutto's. Dit is de grootste groep die in ons gebied is genoteerd. Andere belangrijke pleis-



terplaatsen zijn de Nieuwe Droogmaking met 65 vogels op 9 april en op 3 april 130 vogels in de Bergboezem. *Visdieven* hebben gebroed in de Eendragtspolder rond de roeibaan, op de eilandjes in de Nieuwe Droogmaking (9), in de Bergboezem (2) en in de Klappolder-zuid en in de Eendragtspolder. Ook werd er op verschillende plaatsen op daken gebroed met op 10 juni bijvoorbeeld 20 vogels boven en op een plat dak langs de Lamsrustlaan in Hillegersberg.

Kokmeeuwen broedden op de kunstmatige eilandjes in de Klappolder-zuid, in de Eendragtspolder (42) en in de Nieuwe Droogmaking met 130-140 bezette nesten. Het broedsucces was in de Nieuwe Droogmaking laag. Een nieuwe locatie was een succesvol broedgeval in de Voorofschse Polder bij Waddinxveen. Al op 28 maart verzamelde een paar *kleine mantelmeeuwen* nestmateriaal bij het bedrijventerrein Coenecoop in Waddinxveen. Op 10 juni werden zeven bedelende jongen met nog wat donsveren op de kop gezien op verschillende plaatsen in Schiebroek. Ook in Nesselande-west werd een jong gezien dat hoogstwaarschijnlijk ter plaatse op een dak was geboren. Van de *ooievaar* werden twee bezette nesten ontdekt in de Groenzoom (met drie jongen) en in het Ommoordse veld.



Ijsvogel © Peter Soer

Ons gebied kent twee aalscholverkolonies: rond de Plas van Poot bij Zoetermeer met 84 nesten, het hoogste aantal ooit (65 in 2024). In het Koornmolengat blijft het aantal bezette nesten dalen en was dit jaar met 36 (45 in 2024), het laagste sinds 2003.

Er was maar één bezet nest van *lepelaars*, in de blauwe reigerkolonie

op een van de eilandjes in de Zevenhuizerplas. In 2024 werden vier bezette nesten gevonden. Het aantal territoria van *roerdompen* was waarschijnlijk kleiner dan in 2024. Naar schatting waren er tien territoria. Vooral het geringe aantal waarnemingen in het Plasdrasgebied gedurende de broedtijd (7) was in vergelijking met 2024 (48) opvallend. Ook in de Groenzoom werden, bij een gelijkblijvende waarnemers-inspanning minder vogels gezien en gehoord dan in 2024. In de Rottemeren kwamen twee paar *woudapen* tot broeden. Een



Havik © Mart van Hamburg

paar had zelfs een tweede succesvol broedsel. De woudaap blijft een zeldzame broedvogel in Nederland met in 2025 slechts 35 territoria. *Blauwe reigers* broedden weer op de eilandjes in de Zevenhuizerplas. Hier werden 80 (69 in 2024) bezette nesten geteld. De kolonie bleef hiermee veruit de grootste in ons gebied. De kolonie in het Lage Bergse Bos telde 14 (17 in 2024) bezette nesten op verschillende locaties, de Plas van Poot bij Zoetermeer zestien (22 in 2024), langs de Straatweg in Hillegersberg acht (2024: zeven) en in het Koornmolengat vijf (9 in 2024). Verder waren er weer kolonies in het Gouwebos, bij de Bergboezem (minstens 8 bezette nesten). In het Schiebroekse park werd een nieuwe kolonie opgemerkt van minstens vier bewoonde nesten.

Van de *ransuil*, *bosuil*, *steenuil* en *kerkuil* zijn veel waarnemingen uit de broedtijd, maar om hoeveel territoria het gaat is moeilijk te bepalen. Het aantal territoria van *haviken* was waarschijnlijk groter dan vorig jaar: twee in of rond het Bentwoud, één op het Pekland en omgeving en waarschijnlijk twee op de eilandjes in de Zevenhuizerplas. Mogelijk waren er ook territoria in het Lage Bergse Bos

(vijf waarnemingen binnen de richtlijnen van Sovon) en rond het Koornmolengat. Evenals vorig jaar werden er drie territoria van *bruine kiekendieven* vastgesteld: in het Bentwoud, het Hoge Bergse Bos en in de Eendragtspolder.

Er zijn het afgelopen jaar weer wat meer *ijsvogels* waargenomen dan in voorgaande jaren. In het begin van de broedtijd (datagrenzen Sovon 15 maart- 15 mei) werden uit 45 km-hokken ijsvogels gemeld. Naar schatting op tien verschillende plaatsen hebben ijsvogels gebroed. Of en hoeveel *boomvalken* er in ons gebied gebroed hebben is niet duidelijk. Veel waarnemingen komen uit de Eendragtspolder, het Koornmolengat, het Gouwebos, het Bentwoud, het Schiebroekse park en de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom. *Baardmannen* hebben gebroed in de Noordrand van de Zevenhuizerplas en in het Plasdrasgebied in de Eendragtspolder.

Er werden maar twee kolonies van de *oeverzwaluw* doorgegeven, op vogel-eilandjes: 80 en 40 in de Boterdorpsche polder west. In en rond Moerkapelle werden in totaal 264 bezette nesten van *huishwaluwen* geteld, een recordaantal. Op één huis werden zelfs 52 nesten gevonden. Ook werd er gebroed op verschillende andere plaatsen: langs de Rotte in Zevenhuizen en Bleiswijk.

Cetti's zanger was in de broedperiode in 78 km-hokken aanwezig. In 2024 waren er 73 km-hokken bezet. De opmars gaat blijkbaar nog steeds door. De eerste waarneming voor ons gebied stamt uit 2010 toen een zingende vogel werd gehoord in een ruigte op een van de eilandjes rond de Prins Willem-Alexanderroeibaan. Daarna werden pas in 2014 weer



Baardman © Jenny van Dorland



zingerende *Cetti's zangers* gehoord in het Koornmolengat en de Wiebertjes. Ook de *snor* doet het goed, maar de toename is minder spectaculair dan de *Cetti's zanger*. De *snor* werd in de broedtijd in 22 km-hokken waargenomen met als belangrijkste gebieden de noordoever van de Zevenhuizerplas, het Plasdrasgebied en rond de roeibaan in de Eendragtspolder, de Voorofsche polder en de nieuwe Droogmaking. In de periode 2014-2018 waren gemiddeld acht km-hokken bezet. *Snorren* broeden vooral in natte rietlanden. De *sprinkhaanzanger* is in 25 km-hokken in de broedtijd geregistreerd. In 2024 bezette de soort nog maar 15 km-hokken. Mogelijk houdt dit verband met uitbreiding van de (riet)ruigten in ons gebied, onder andere langs de Rotte en in het Plasdrasgebied.



Visarend © Chris de Rouck

Al sinds 2010 worden *boomklevers* vaak in het Lage Bergse Bos gezien. De laatste jaren is dit de enige plek in ons gebied waar ze broeden. Ook dit jaar was dit het enige gebied waar ze meerdere malen in de broedtijd werden waargenomen. Het Bentwoud blijft het belangrijkste bolwerk voor de *nachtegaal*. De indruk bestaat dat het aantal territoria terugloopt, buiten het Bentwoud zijn alleen eenmalige waarnemingen bekend.

Het Bentwoud is ook het belangrijkste bolwerk voor de *roodborsttapuit*. Daarnaast zijn territoria vastgesteld in de Schiebroekse Polder en de aangrenzende Zuidpolder.

Ringmussen werden gedurende de broedtijd in 14 km-hokken waargenomen. Vooral rond de Rottemeren bevinden zich nog enkele concentraties van territoria. Op 14 juni werd een baltsende *graspieper* langs het Bentwoudpad ten zuiden van het Bentwoud gezien. Dit is de enige waarneming die wijst op een mogelijk

broedgeval. *Appelvinken* zijn lastig te tellen als broedvogel. Sterke aanwijzingen voor broedgevallen werden gemeld uit het Bentwoud, het Gouwebos en de Bleiswijkse Zoom. Het jaarlijks aantal waarnemingen neemt al sinds 2020 toe.

Winter- en trekvogels, dwaalgasten.

Op 11 november foerageerde er een *rotgans* tussen de grauwe ganzen in de Eendragtspolder. In de Voorofsche Polder verbleef van 3 tot 6 februari een *roodhalsgans*. In dezelfde polder werd er weer één gezien op 29 september. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een ontsnapte vogel. In de eerste helft van januari foerageerde in de Zuidpolder bij Berkel en Rodenrijs een *kleine rietgans*. Op 14 november vloog er een groep van 55 vogels zuidwestwaarts boven de Zuidpolder. De twee *wilde zwanen* verbleven ook dit jaar nog geruime tijd in de Eendragtspolder, tot 18 april. Ze waren daar al vanaf 17 november 2024 aanwezig. Het vuilwitroze op de snavels, kenmerkend voor onvolwassen vogels, was inmiddels veranderd in geel-zwart, een kenmerk voor volwassen vogels. Op 13 december vlogen er twee wilde zwanen over in de Groenzoom. In januari werden op drie verschillende plaatsen *kleine zwanen* gezien: in de Groenzoom een vogel op 9 januari, in de Zuidplaspolder 3 vogels op 24 januari en een groep van acht vogels vlogen op 29 januari boven Waddinxveen.

Op 13 juli werd in het Plasdrasgebied in de Eendragtspolder een juveniele *witoogend* ontdekt. Het is onduidelijk waar de vogel is uitgebroed. Een vrouw *toppereend* verbleef van 15-29 november in het Plasdrasgebied en rond de roeibaan. *Brilduikers* waren te zien van 4 januari tot 4 april en van 26 oktober tot 31 december rond de roeibaan, het Plasdrasgebied, de Rottemeren, de Bergsche plassen en de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom. *Grote zaagbekken* werden onder meer gezien in de Rottemeren en de roeibaan. Van 29 oktober tot 13 december was er een vrouw aanwezig in de Groenzoom. Opvallend is de waarneming van vijf overvliegende

de vogels boven het Plasdrasgebied op 10 augustus.

Tweemaal vlogen *kraanvogels* over, een groep van elf vogels boven Berkel en Rodenrijs oostwaarts op weg naar hun broedgebied en een eenzame vogel boven de Zuidplaspolder. Op de roeibaan was van 2 januari tot 8 februari een *kuifduiker* aanwezig. Op de Zevenhuizerplas werd er één op 2 en 23 februari opgemerkt. *Geoorde futen* waren vrijwel het gehele jaar aanwezig, met uitzondering van de maand juni. De meeste vogels werden gezien rond de roeibaan, op de Zevenhuizerplas en in de Groenzoom. Van 21 juli tot 19 september was er een *zwarte ibis* te zien in de Groenzoom. Later werd een overvliegende vogel waargenomen op 18 oktober in het Plasdrasgebied. Een *strandplevier* werd op 19 mei ontdekt langs de roeibaan. Deze kustvogel is in het binnenland zeldzaam; de laatste waarneming in ons gebied stamt uit 2017.



Purperkoet

© Coen van Nieuwamerongen

Er werden weer enkele *silverplevieren* opgemerkt. In het voorjaar op 21, 24 april en 23 mei en in het najaar op 28 en 29 september, 7 en 12 oktober en 8 november. Op 3 april werd er een overvliegende, roepende *morinelplevier* boven Waddinxveen waargenomen. Dit is de enige waarneming van het afgelopen jaar. *Houtsnippen* waren aanwezig van 12 januari tot 29 maart en van 18 oktober tot het einde van het jaar.. In het Bentwoud werd een maximum van vijftien foeragerende vogels geteld op 27 november. Het voorkomen van *steenlopers* is in ons land vrijwel beperkt tot zoute en brakke watergebieden. Toch is hij in ons gebied een bijna jaarlijkse, zeldzame doortrekker. Ook in het afgelopen jaar werden er weer vogels gezien rond de roeibaan in de tweede



helft van mei en op 27 en 28 augustus. In het voorjaar werden solitaire *kanoeten* langs de roeibaan gezien van 24-29 april en in het najaar van 25 augustus tot 29 september. *Kleine strandlopers* waren talrijker, de eerste werd gezien op 9 april, de laatste op 9 oktober. Waarnemingen kwamen van de roeibaan en omgeving, het Plasdrasgebied, de Nieuwe Droogmaking en de Bergboezem. *Krombekstrandlopers* werden gezien in de Eendragtspolder en de Nieuwe Droogmaking van 22-24 april, 24-29 juli en van 5-24 september. Een *gestreepte strandloper* verbleef op 18 en 19 augustus in de Nieuwe Droogmaking. Op 18 februari werd op de slaapplek in de Nieuwe Droogmaking het aantal *wulpen* op 400- 500 vogels geschat.



Duinpieper © Garry Bakker

Op 26 juni werd 's nachts in de Bergboezem een *kwartelkoning* gehoord. Mogelijk waren er twee verschillende vogels roepend aanwezig. In het voor- en najaar werden er weer veel *porseleinhoenders* gehoord en gezien in het Plasdrasgebied, het Populierenbosje langs de Zevenhuizerplas en in de Voorafschepolder. In de nacht van 30 juni-1 juli werd in Bergschenhoek een roepend *porseleinhoen* geregistreerd met een geluidsrecorder. Meerdere vogels werden op 27 augustus gevangen en voorzien van een kleurring in de Eendragtspolder. De eerste waarneming was op 22 maart, de laatste 22 oktober. Er waren geen duidelijke aanwijzingen voor een broedgeval.

De meest opmerkelijke soort was het afgelopen jaar zonder twijfel de *purperkoet*. Geen nieuwe soort voor ons gebied, want van 22 tot 28 december 2021 was ook al een vogel waargenomen, in vrijwel hetzelfde gebied. Zou het dezelfde vogel zijn geweest?

Niet uitgesloten, maar onmogelijk te bewijzen. Deze keer was de vogel van 26 augustus t/m 23 december vrijwel honkvast in het Plasdrasgebied. In deze periode was de vogel slechts enkele dagen vertrokken naar de Driemanspolder. De purperkoet werd maar liefst 2.086 keer op de site www.rotta-natuur.nl ingevoerd en was hiermee de meest gemelde soort van 2025. Het was de derde waarneming voor Nederland.

Een gekleurringde *kokmeeuw* die op 12 augustus bij de roeibaan werd gezien, bleek in 2022 als adult geringd in Rivne op een vuilnisbelt, zo'n 200 km te westen van Kiev, Oekraïne. *Zwartkopmeeuwen* werden van 31 januari tot 24 augustus gezien, maar er zijn geen aanwijzingen voor een broedgeval. Vooral in april was er een duidelijke noordoostwaarts gerichte trek met op 21 april 32 exemplaren in drie groepen. De jaarlijkse doortrek van *dwergmeeuwen* begon op 11 april toen de soort werd waargenomen op de Rottemeren, Bergsche Plassen en de roeibaan. Het hoogste aantal werd bereikt op 13 april toen er 26 vogels gezien werden op de Rottemeren. De laatste vogel werd gezien op 18 april in de Bergboezem. In het najaar was er maar een waarneming in de Eendragtspolder. Doortrekkende en kortstondig pleisterende *witwangsterns* in waren op 15 en 19 april aanwezig in de Nieuwe Droogmaking en op 28 en 29 april op de Rottemeren en rond de roeibaan met een maximum van zeven vogels. Tijdens de voorjaars-trek werd op 9 april de eerste *zwarte stern* gezien. De laatste, op najaars-trek werd waargenomen op 14 september. De vogels foerageerden voornamelijk op de Rottemeren en



Zwarte mees © Ruben Luiten

rond de roeibaan. 's Avonds op 14 april werd een recordaantal van naar schatting 160 exemplaren gezien. Een volwassen *lachstern* was kort ter plaatse in de Eendragtspolder op 27 augustus. Op 7 april werd er een *reuzenster* gezien langs de roeibaan en op 28 augustus foerageerde er één in de Nieuwe Droogmaking.

Er was slechts één waarneming van een *kwak*: een juveniele, overvliegende vogel in de Groenzoom op 20 augustus. *Kleine zilverreigers* doen het nog steeds goed in ons gebied. Er waren het afgelopen jaar meer waarnemingen dan ooit met een duidelijke piek in augustus. Het Koornmolengat fungeert al sinds 2011 als slaapplek. Het afgelopen jaar werd een nieuw record gevestigd, er sliepen op 2 oktober zestien vogels. Het hele jaar verblijven tegenwoordig *grote zilverreigers* in ons gebied, met het grootste aantal in oktober. Ook deze soort slaapt in het Koornmolengat met op 23 februari een maximum van elf vogels. In het Plasdrasgebied werd op 10 en 11 januari een blijkbaar overwinterende *purperreiger* gezien. Op 22 maart werd een eerste voorjaars-trekker gemeld. Deze voorjaars-trek duurde tot eind mei. Vooral in de Bergboezem en het Plasdrasgebied werden tot 17 september solitaire vogels waargenomen. Ook *koereigers* sliepen in het Koornmolengat met een maximum van drie vogels op 22 augustus. Vrijwel het gehele jaar werden *koereigers* gezien, alleen in januari en juli ontbreken waarnemingen. Op 31 mei werd een groepje van acht vogels opgemerkt, overvliegend boven de Zevenhuizerplas.

Viermaal werd afgelopen jaar een overvliegende *rode wouw* gezien: op 11 januari boven de Zuidplaspolder noordoostwaarts, op 4 maart oostwaarts boven de Nieuwe Droogmaking, de volgende dag boven Waddinxveen en op 17 juli boven Terbrugge. April en mei zijn de maanden waarin trekkende *zwarte wouwen* zijn te zien. Op 16 april boven het Bentwoud, 21 april boven de Eendragtspolder en op 30 april boven de Voorafschepolder en Tweemanspolder-zuid. Ten slotte werd er ook één gezien op 3 juni boven het Bentwoud.



In lijn met de landelijke toename van *zeearenden* worden ze ook in ons gebied steeds vaker gezien. Opvallend is dat er uitsluitend overvliegende vogels zijn waargenomen en geen enkele aan de grond. Dit jaar ging het om 23 waarnemingen. In het voorjaar en de vroege zomer werden er vanaf 4 april noord- en noordoostwaarts



Poseleinhoen © Garry Bakker

trekkende *visarenden* gezien. Vanaf augustus vlogen de eerste alweer naar hun overwinteringsgebieden in Afrika. De laatste werd op 2 oktober gezien.

Wespendieven overwinteren ook in Afrika. De eerste werd pas op 15 juni gezien; de laatste op 18 september. In het Bentwoud was een mogelijk territoriaal paar aanwezig. Een groep van tien tot twaalf *vale gieren* vloog op 18 juni over Bergschenhoek westwaarts en werd daarna nog gezien boven Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en tenslotte boven de luchthaven Zestienhoven. In verschillende gebieden werden in februari, april, september, oktober en november een *velduil* gezien.

Minstens vier *bijeneters* werden overvliegend gezien en gehoord op 13 augustus boven de Warmoeziersweg bij Bergschenhoek. De meeste *blauwe kiekendieven* werden waargenomen in de Eendragtspolder, rond de roeibaan, het Bentwoud en de Nieuwe Droogmaking in de maanden januari en februari. Een tweede kalender jaar man *grauwe kiekendief* werd jagend gezien in de Polder de Wilde Veenen op 14 juni. Dit was de enige waarneming van deze soort in 2025. Op verschillende plaatsen werden weer *smellekens* gezien, in twee perioden van 10 maart tot 6 mei en van 24 augustus tot 31 oktober. Vooral in het

Plasdrasgebied werden slechtvalken regelmatig in de broedtijd gezien, maar er waren geen aanwijzingen voor broeden in ons gebied.

Op 1 mei vloog een *zomertortel* over tussen Waddinxveen en Boskoop. *Wielewalen* werden vanaf 2 mei tot 1 juni bij het Populierenbosje langs de Zevenhuizerplas, in het Lage Bergse Bos en in het Koornmolengat waargenomen, maar er waren geen aanwijzingen voor een territorium. Vanaf 23 februari waren vooral in de maand maart weer *roeken* aanwezig in de Eendragtspolder - West. Op 9 maart werd een maximum van 25 vogels gezien. Ook in de polder Achterof bij Waddinxveen werden roeken waargenomen, onder andere een groepje van zeven op 18 maart.

Er werden meer *zwarte mezen* gezien dan de afgelopen zeven jaar. Landelijk gezien gaat de soort als broedvogel en trekvogel sinds 1985 achteruit en is inmiddels op de Rode Lijst beland. Er werd geen enkele zekere *bladkoning* waargenomen. De eerste *waterrietzanger* werd op 8 augustus gezien in het Plasdrasgebied. Het was een eerste jaarsvogel, die in Litouwen als nestjong voorzien was van een kleurring met code. De vogel blijkt



Waterrietzanger © Johan Batist

afkomstig van een project in Litouwen en betreft één van 52 exemplaren die in het wild uit een nest is gehaald, is opgegroeid in kooien in een ander natuurgebied en daarna weer is losgelaten. Een tweede, ongeringd ex. was tot 10 augustus ter plaatse. Sinds 2018 is deze soort een jaarlijks terugkerende doortrekker, vrijwel altijd in augustus en vrijwel altijd in

het in het Plasdrasgebied. Het is een van de meest bedreigde zangvogels van Europa. Er zijn geen waarnemingen van *bladkoningen*. Een *Pallas' boszanger* werd ontdekt op 12 no-



Zwartkopmeeuw

© Cas van de Giessen

vember in het Gouwebos. Op 24-28 november was er één aanwezig in de Voorafsche Polder. Er was maar één waarneming van een *fluitier*. Het ging om een zingende vogel op 1 mei in Waddinxveen. Opvallend: dit jaar was er geen enkele waarneming van een *grote karekiet*.

Op 6 september werd in de Zuidplaspolder een *duinpieper* ontdekt. De vogel bleef daar tot 8 september en op 19 september zou er één zijn gezien en gehoord boven het Plasdrasgebied. Evenals in 2024 werd er rond de roeibaan op 1 oktober een *oeverpieper* gezien en gefotografeerd. Op 15 oktober was er één aanwezig in het plasdrasgebied. Oeverpiepers zijn echte kustvogels en regelmatig te zien op strekdammen en dergelijke. In het binnenland zijn ze schaars en vaak moeilijk van andere piepers te onderscheiden. Op 30 november werd er in een tuin in Bleiswijk een roepende *goudvink* gehoord. Op 2 november was er een onbevestigde waarneming in het Schiebroekse park. Eén of meerdere overvliegende *fraters* werden gehoord op 21 november boven de Voorafsche Polder. Op verschillende plaatsen werden *barmsijzen* waargenomen; op 25 februari, 8 april en regelmatig gedurende de periode 26 september- 15 december. In vrijwel alle gevallen betrof het overvliegende vogels. Een overvliegende *geelgors* werd op 30 oktober gezien boven Waddinxveen. <<